

Dans ces dernières années, on a apporté quelques modifications aux Chambres noires, pour les rendre d'un usage commode en photographie; nous n'avons pas à nous occuper de ce sujet.

298. Dans une Chambre noire le champ de la vision est de 30 à 35 degrés, mais les parties du dessin éloignées du point principal de la perspective sont un peu altérées. Généralement on réduit le champ à un seizième de l'horizon; la distance est alors égale à deux fois et demie la largeur du dessin, proportion qui est très-convenable, comme nous l'avons vu.

La distance principale est la perpendiculaire abaissée du centre optique de la lentille sur la planchette; elle diffère peu de la distance focale, et par conséquent elle reste à peu près constante pour une même lentille, mais, comme on peut donner plus ou moins de largeur au dessin, la distance relative varie entre certaines limites.

Chambre claire.

299. La Chambre claire a été inventée par Wollaston, en 1804.

Quand on regarde sous de certaines incidences dans une glace à faces parallèles, on voit en même temps, par réfraction, les objets situés au delà, et par réflexion certains objets situés en decà. Plaçant derrière la glace une feuille de papier sur une planchette, on peut y calquer l'image des objets par réflexion.

Si le spectateur met son œil en O (fig. 224), il verra un objet A_1C_1 en AC , au delà de la planchette TT' par la réflexion de la glace mn . Le calque qu'il pourra faire sera un dessin symétrique de la perspective de l'objet, prise d'un point de vue O_1 , sur un tableau qui serait placé en $T_1T'_1$. L'image étant virtuelle n'est contrariée ni par la planchette, ni par le crayon ou la main du dessinateur.

La figure 224 ne fait pas ressortir la symétrie, parce que l'objet repré-

senté est une simple ligne; mais la disposition des images par réflexion est tellement connue, que nous croyons inutile d'insister sur ce point.

300. Supposons maintenant que l'on emploie deux glaces mn et nr (fig. 225). Si l'on détermine un point O_1 symétrique par rapport à mn du centre O du cristallin, et un point O_2 symétrique de O_1 par rapport à nr , l'effet des deux réflexions successives sera de réunir au point O les rayons qui convergeaient vers O_2 . Le cône perspectif de l'image A_1C_1 , vue de O_1 est symétrique des cônes perspectifs de l'objet A_2C_2 vu de O_2 , et de l'image AC vue de O : ces deux derniers sont donc identiques.

Considérons un rayon brisé C_2eiO situé dans un plan perpendiculaire aux deux miroirs; nous aurons entre les angles des triangles nei , qei les relations

$$nie + nei = 180^\circ - ine$$

$$qie + qei = 180^\circ - iqe.$$

D'après la loi de la réflexion, les angles contenus dans le premier membre de la seconde équation sont doubles de ceux du membre correspondant de la première; donc, si nous retranchons la seconde équation du double de la première, nous aurons

$$180^\circ - 2.ine. + iqe = 0.$$

L'angle iqe , qui mesure la déviation du rayon considéré, ne dépend donc de l'angle des miroirs; il est droit quand les miroirs sont inclinés l'un sur l'autre de 135° : tous les rayons situés dans le plan de la figure se trouvant alors déviés à angle droit, l'image calquée sur une planchette horizontale TT' sera exactement la perspective de l'objet, prise du point O_2 , sur un plan vertical $T_2T'_2$.

Les circonstances ne sont pas les mêmes dans le cas de la figure 224 ; le rayon d'un seul point B_1 est dévié à angle droit, et le tableau fictif $T_1T'_1$ doit être supposé dans une position symétrique de la planchette par rapport à la glace.

301. Dans les dispositions que nous venons d'indiquer, l'image manque généralement de netteté, parce qu'il se produit une réflexion à chaque face des lames de verre, et qu'il y a des réfractions qui affaiblissent la lumière. Le moyen le meilleur et le plus employé de remédier à ces inconvénients, consiste à remplacer les glaces par un prisme ayant un angle de 135° , deux de $67^\circ 30'$, et le quatrième de 90° (fig. 225 bis). Le cône perspectif rencontre les faces inclinées sous des incidences qui déterminent des réflexions totales, mais on ne peut plus voir la planchette par réfraction : il faut placer l'œil au-dessus de l'arête u , de manière qu'il reçoive des demi-faisceaux, les uns réfléchis venant de l'objet, les autres directs venant de la planchette. Ces demi-faisceaux suffisent pour faire voir distinctement l'objet et le dessin ; mais il faut un peu d'habitude pour maintenir son œil exactement sur l'arête.

Les différents rayons qui forment le cône perspectif subissent deux réfractions : l'une, à la face d'incidence, l'autre, lorsqu'ils ont été déviés à angle droit, à la face d'émergence. Les choses se passent comme si le cône, sans éprouver de réflexion, traversait une glace dont les faces fussent parallèles, c'est-à-dire que les effets des deux réfractions se détruisent.

Le prisme est placé dans une monture qui forme diaphragme à la face supérieure, n'en laissant apparente qu'une très-petite partie voisine de l'arête. La position de l'œil dans le sens de la longueur du prisme, se trouve ainsi déterminée d'une manière précise.

302. L'image virtuelle AC (fig. 225), et la planchette TT' sont à des distances très-différentes du prisme ; il en résulte que l'œil éprouve de la fatigue à les regarder fixement à la fois, et que le plus petit dépla-

ement du spectateur altère le dessin, car l'image est immobile dans l'espace, et, malgré le diaphragme, l'œil peut encore s'éloigner un peu sans cesser de voir l'objet et la planchette.

Pour remédier à ce double inconvénient, les chambres claires sont généralement pourvues d'une lentille bi-concave qui, placée devant la face d'incidence, rapproche l'image : quand elle se trouve précisément sur la planchette, le déplacement de l'œil n'altère plus le dessin.

Wollaston a proposé de remplacer la lentille par une simple calotte sphérique creusée sur la face supérieure du prisme. M. Laussédât a montré qu'il convenait de placer le centre de la calotte sur l'arête; il donne au rayon de la sphère une grandeur de 15 centimètres qui, d'après la puissance réfractive du verre, convient pour amener à la distance de 30 centimètres l'image d'un objet éloigné. Le prisme doit être élevé à cette hauteur au-dessus de la planchette; si son support peut être allongé, il faut, dans chaque cas, lui donner la longueur nécessaire pour que l'image des objets regardés soit exactement sur la feuille de dessin.

La figure 223, prise dans le mémoire de M. Laussédât, donne en vraie grandeur le plan et l'élévation du prisme *hémipériscopique* qu'il emploie. La figure 222 est une perspective cavalière un peu amplifiée. On voit sur la figure 221 la chambre claire établie au-dessus de la planchette.

303. Le champ horizontal d'une Chambre claire s'étend facilement à 60 degrés. Le champ vertical est indéfini, si le prisme est monté de manière à pouvoir tourner autour de l'arête *u* (fig. 225 *bis*); car la déviation du cône perspectif, qui ne dépend que de l'angle des faces réfléchissantes, reste la même pendant le mouvement de rotation du prisme, et l'image est fixe sur la planchette; seulement elle s'efface graduellement dans le bas, et se développe dans le haut, ou inversement.

En résumé, la Chambre claire a un champ total plus étendu qu'il n'est nécessaire dans la pratique.

Pour que le tracé ne fatigue pas la vue, il faut que l'image et le dessin aient à peu près le même éclat. On affaiblit en conséquence la lumière d'un côté ou de l'autre, en projetant de l'ombre sur la planchette, ou en plaçant des verres colorés devant le prisme.

304. La planchette et le prisme étant établis de niveau, on détermine le point principal par un fil à plomb, qui rase l'arête du prisme au milieu de la partie restée apparente dans la petite échancrure faite à la monture.

On a la distance principale en mesurant, avec une règle divisée, l'élévation de l'arête du prisme au-dessus de la planchette. On peut aussi opérer comme il est dit à l'article 292.

Le moyen le plus simple d'obtenir la ligne d'horizon consiste à prendre les perspectives de quelques droites verticales, et à leur mener une perpendiculaire du point principal : c'est ainsi qu'on opère pour le diagrafhe et pour la chambre noire ; mais comme le paysage ne présente pas toujours des droites verticales, et que l'emploi du fil à plomb peut être contrarié par l'agitation de l'air, nous indiquerons un moyen commode et exact décrit par M. Laussédât.

Supposons qu'on ait pris la perspective M d'un point m sur un tableau ab (fig. 226). Si ce point parcourait un cercle horizontal autour de la verticale du spectateur, sa perspective décrirait une courbe MmM_1 , et, après s'être rapproché de la ligne d'horizon, reviendrait à sa hauteur primitive et à la même distance de la verticale pr , quand le point m serait parvenu à une position m_1 symétrique de m .

On ne peut pas faire mouvoir le point que l'on vise, mais on obtient le même résultat graphique, en faisant tourner horizontalement la planchette ; elle entraîne avec elle la Chambre claire, et on voit le point visé décrire une courbe, et couper successivement en deux points M et M_1 un arc de cercle qu'on a eu soin de tracer du point principal

comme centre, avec un rayon d'une grandeur suffisante. La droite **MM**, est parallèle à la ligne d'horizon.

On voit sur la planchette de la figure **221** la ligne d'horizon, les arcs de cercle qui ont servi à la déterminer, et les courbes décrites dans le mouvement de rotation par les images des points considérés.

