

anderen Achsen rationale Teile oder Vielfache der Einheitslängen dieser Achsen ab. (Fig. 10.)

In Fig. 10 ist  $D$  die Einheitsfläche  $a : b' : c$ , die anderen als Beispiel gezeichneten Flächen schneiden das Achsenkreuz  $a, b, c$  in  $a : \frac{2}{3} b : \frac{1}{2} c$ ;  $a : b : c$ ;  $a : 2 b : c$ .

In Fig. 9 würde  $E$  ergeben  $a : \frac{4}{3} b : 2 c$ ; beim Kupfervitriol wären also diese Längenschnitte  $0,5721\dots : \frac{4}{3} : 2 \cdot 0,5554\dots$ .

Die Rationalität der Achsenschnitte bleibt natürlich erhalten, wenn man die so gewonnenen Koeffizienten mit ganzen Zahlen multipliziert oder dividiert, geometrisch ausgedrückt: wenn man die Flächen parallel sich selbst entsprechend verschiebt.

Allgemeiner Fall: Wenn das Achsenverhältnis  $a : b : c$  ist, so schneiden die Flächen  $E, F$  usw. auf dem Achsenkreuz Längen  $ma : nb : pc$  ab, wobei die Koeffizienten  $m, n, p$  mit den ver-




Fig. 10. Einfache Rationalität der Achsenschnitte.




Fig. 11. Flächenlagen  $hkl$ .

schiedenen Flächen wechselnde, aber rationale, meist einfache Zahlen sind etwa in der Folge  $0\dots 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, 1, \frac{4}{3}, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}, 3, 4\dots \infty$ .

Bemerkungen: Der Zonenverband und die Koeffizienten der Achsenschnitte abgeleiteter Flächen bleiben bei Änderung der Temperatur der Kristalle erhalten.

Zonenverbandsgesetz und Parametergesetz sind der Ausdruck der nämlichen Regelmäßigkeit im Kristallbau.

### 5. Flächen- und Zonensymbole.

a) Flächensymbole von Weiß. Sie werden nach den Schnitten der Kristallflächen auf  $a, b, c$  gebildet, wobei man die Arme des Achsenkreuzes, die hinten, links und unten liegen, durch  $a', b'$  und  $c'$  bezeichnet.

$\infty a : b : \frac{1}{2} c$  würde somit eine Fläche sein, die der  $a$ -Achse parallel geht, die  $b$ -Achse in  $1 b$  und die  $c$ -Achse in  $\frac{1}{2} c$  trifft.