

besitzt, wird bei seiner Beschreibung erörtert. Unverkennbar erinnert auch seine Lage zum unteren Bug an die Lage des Nekeithales zu dem der unteren Warthe. Wie im Nekegebiet die Senke des Goploees und der oberen Neke von Süden her mit dem ost-westlich gerichteten Thorn-Eberswalder Hauptthale zusammen trifft, so vereinigt sich im Narewgebiet der obere Narew mit der ein übermäßig breites, in seiner Form durchaus den diluvialen Hauptthälern ähnliches Thal durchfließenden Bjebrza. Das tief eingeschnittene Jagintyer Bruch stellt eine Verbindung des Narew- und Njemengebiets her, wie das Bromberger Thal eine solche des Neke- und Weichselgebiets bewirkt. So weit reicht die Aehnlichkeit.

Verschieden liegen aber die Verhältnisse in zwei wesentlichen Punkten. An der Warthe deutet Alles darauf hin, daß in der Diluvialzeit ein mächtiger Strom gegen Westen geflossen ist. Am Bug dagegen liegt die breite Niederung des Polesje nach Osten hin offen, geht in das Buggebiet unmerklich über und findet ihr westliches Ende erst im unteren Krznathale links vom Brest-Litowsker Becken. Eine zweite Verschiedenheit besteht darin, daß an der Warthe das Odra-bruch eine klar ausgesprochene Thalform besitzt, die äußerst flach eingesenkte Rinne zwischen Krzna und Tysmjenica (Bug und Wjeprz) aber nicht. Letztere gleicht mehr dem Sumpfgebiete am Bialowjezer Urwald und an der Vereinigungsstelle des Oginskikanals mit der Szczara, wo eine undeutliche Trennung zwischen den Gebieten der Ostsee und des Schwarzen Meeres noch jetzt besteht. Hier und in dem von Radzyn über Parczew nach der Wlodawka ziehenden Sumpf- und Seelände, das jetzt nach dem Wjeprz und dem Bug entwässert, mag eine solche undeutliche Trennung auch vielleicht ehemals bestanden haben.

Sollten nähere Untersuchungen ergeben, daß der untere Bug wirklich ein jüngeres Durchbruchsthal durchfließt, wie es den Anschein hat, so wäre anzunehmen, daß vor der Ausbildung dieses Thales der Bug zum Dnjeprgebiete gehörte, die Hauptwasserseide also zwischen Bug und Wjeprz lag bis in die Gegend von Lukow, von dort aber (etwa über Mjelnik) nach dem Narewgebiete zog. Das bogenförmig den Brest-Litowsker Thalkessel im Westen umgrenzende Höhenland, das die Krzna und die Lesna fast auf einem Punkte zusammenführt, wäre dann der natürliche Abschluß des Dnjeprgebiets gewesen, wie es der natürliche Abschluß des Polesje auch jetzt noch ist.

2. Gewässernetz.

a) Nebenbäche oberhalb der Muchawjecmündung.

Auf S. 125/6 haben wir schon erwähnt, daß der Bug zwischen dem Becken des Quellgebietes und dem Brest-Litowsker Thalbecken keinen einzigen bedeutenden Zufluß erhält. Aus dem linksseitigen Sokaler Hügellande kommt die unweit der Kreisstadt Grubjeszum mündende Huczwa, deren nordwärts gerichteter, zuletzt nach Osten umbiegender Lauf links einige fast genau östlich fließende Bäche vom Lubliner Hügellande aufnimmt. Auch ihr nordöstlich von Tomaszum, nur 4 km von der Wjeprzquelle entfernt, entspringender Quellbach hat diese Richtung. Das Thal der Huczwa, von 20 bis 30 m hohen Hügeln begrenzt, erweitert sich oft auf 1 bis 2 km Breite und ist mit nassen Wiesen bedeckt, ähnlich wie die meisten

Thäler des Lubliner Kreidemergel- und Lößgebietes, welche bis zum Quellenhorizont eingeschnitten sind. — Die Entwässerung des rechtsseitigen Sokaler Hügellandes wird durch die bei Ustilug mündende Luga bewirkt, ihr Gewässernez bietet ein Spiegelbild von dem der Huczwa, da sie in ihrem nördlich gerichteten, zuletzt nach Westen umbiegenden Laufe vorzugsweise westlich gerichtete Zuflüsse von rechts empfängt. Der linksseitige Nebenbach Strib bildet auf kurze Strecke die Reichsgrenze zwischen Rußland und Oesterreich. Oberhalb Wladimir-Bolynsk besteht die Sohle des ziemlich tief eingeschnittenen Lugathales gleichfalls aus nassen, vielfach sumpfigen Wiesen, an zwei Stellen aus Sumpfsseen. Unterhalb jener Stadt ist das Thal eng und von stark geböschten, etwa 15 m hohen Gehängen eingefasst.

Von den übrigen Seitengewässern des mittleren Bug sind nur folgende zu erwähnen: die von links kommenden Nebenbäche Ucherka (unterhalb Opalin) und Wlodawka (bei Wlodawa), ferner die rechtsseitigen Nebenbäche Kopajowka (unterhalb Slawatycze) und die Spanowka (bei Przyluki). — Die Ucherka entspringt in einem sumpfigen Thale am Rande des Lubliner Hügellandes und fließt über Cholm nordwärts, zuletzt ostwärts durch das von dort nach Lufuwel hin ausgebreitete Sumpf- und Sandgebiet. — Die Wlodawka bildet den Abfluß des zur Seengruppe der Tyśmienica gehörigen Wjelfjesees (+ 166 m) bei Wytuczno, in dessen Nähe einige sehr ausgedehnte Sümpfe und Moore gleichfalls in sie entwässern. Kurz vor der Mündung erweitert sich ihr gegen Ost-zu-Nord gerichteter Lauf zum Wlodawaer See (+ 155 m). Auch ihre von rechts einmündenden Nebenbäche werden aus kleinen Seen und großen Sümpfen gespeist.

Die bedeutendsten, noch nicht vertorften Wasserflächen liegen indessen in der östlichen Fortsetzung des bei Lenczna beginnenden Landstriches zur Rechten des Bug, namentlich der Pulemjeckje-, Switjaz-, Lufje-, Orzechowo- und Tur-See nebst vielen mittelgroßen und kleinen Seen, sowie umfangreichen Sümpfen und Mooren, sämtlich in einer Meereshöhe, die wenig über oder unter + 160 m beträgt. Der Prypet nimmt hier seinen Ursprung und fließt nahe bei den genannten Seen vorbei gegen Nordosten. Ihre Entwässerung erfolgt jedoch gegen Nordnordwest durch die Kopajowka und durch die linksseitigen Nebenbäche des Muchawjec gegen Norden nach dem Bug. — Auch die Spanowka (Przrwa) fließt aus dem rechtsseitigen Sumpfgebiete gegen Nordnordwest in den Hauptfluß.

b) Der Muchawjec und seine Seitengewässer.

Von den linksseitigen Zuflüssen des Muchawjec ist am bedeutendsten die beim Dörfchen Podlesje von Süden in den Muchawjec mündende Ryta, die aus den Sümpfen im Norden des Tursees kommt, den Lufowoer See durchfließt und bei Wjelfkoryta links die Maloryta aufnimmt, den Abfluß des Orzechowoer Sees und der benachbarten offenen oder vertorften Becken. Die südwestlich vom Orzechowoer See gelegenen großen Seeflächen liefern einen Theil ihres Abflusses durch einen vom Quellgraben der Kopajowka abzweigenden Seitengraben in das Muchawjecgebiet. Der Tursee hat gleichfalls doppelten Wasserabzug, erstens durch einen von rechts in die Ryta mündenden Graben, zweitens durch den nordostwärts gerichteten, in etwa 8 km Abstand mit dem oberen Prypet parallel

führenden Turskijkanal, der vom Orjehower See ab als Orjehowskikanal nordwärts zum Dnjepr-Bug-Kanal zieht, mit welchem er sich bei Borodiczi vereinigt. Links vom Orjehowskikanal liegt der kleine Lubansee, bei dem zwei Abzugsgräben des Dubowosumpfsgebiets ihren Anfang nehmen. Der nordöstliche mündet in den letztgenannten Kanal, der nordwestliche als Kobrinskikanal bei der Kreisstadt Kobrin in den Muchawjec. Die fast ganz künstlich hergestellte Linie des Dnjepr-Bug-Kanals von Borodiczi über Gorodec nach Ostromez benutzt in der letzten Strecke das Bett eines Baches, der ebenfalls Muchawjec heißt und bei Ostromez von Osten in den von Norden kommenden Quellbach des Muchawjec mündet. Auch seine oben erwähnten Nebenbäche sind zur besseren Speisung des genannten Kanals größtentheils begradigt und geräumt oder vollständig neu als Kanäle ausgehacht worden.

Der Ursprung jenes Quellbaches liegt in den Sümpfen am Bialowjezer Urwalde, aus denen auch die Jasiolka (Dnjeprgebiet), die Lesna und der Narew stammen, nördlich von der Kreisstadt Pruzany. Bis zur Eisenbahnlinie Warschau—Moskau (Brest—Minsk) wird das südlich gerichtete, sumpfige Thal des Muchawjec von niedrigen Anhöhen begleitet; dann tritt es vollständig in die Sumpfebene des Polesje ein und erreicht erst bei Ostromez wieder zusammenhängendes, sehr flaches Höhenland. In dieses bis nach Brest-Litowsk durchschnittlich auf + 140 m liegende Gelände ist das westlich gerichtete, meist 0,5 bis 0,6 km breite Muchawjecthal mit zuletzt etwa + 130 m Sohlenhöhe eingeschnitten. Die Thalsohle besteht aus Torfmoor auf sandigem Untergrunde, in welchen das bei Mittelwasser 20 bis 50 m breite, 1,4 bis 1,7 m tiefe Bett eingreift. Ueber die zur Schiffbarmachung des Muchawjec ausgeführten Bauten wird bei der Beschreibung des Bug-Dnjepr-Kanals (2. Abth., Kap. 17) berichtet. Sieht man von den hierfür angelegten Staufusen ab, so beträgt das mittlere Gefälle von Ostromez (+ 145 m) bis zur Mündung bei Brest (+ 127 m) auf 90 km Länge 0,200 ‰ (1 : 5000), im Oberlaufe vom Quellsumpf (+ 160 m) bis Ostromez auf 43 km Länge 0,349 ‰ (1 : 2870), im Ganzen auf 133 km Lauflänge bei 33 m Fallhöhe 0,248 ‰ (1 : 4030). Die Luftlinien sind für den Oberlauf 38, für den Unterlauf 62, für den Gesamtlauf 80 km lang, was einer Entwicklung von 13,2, 45,2 und 66,3 ‰ entspricht. Diese Entwicklung rührt hauptsächlich von den Richtungsänderungen des Thals her, da der Muchawjec im Oberlaufe von Natur eine schlanke Form besitzt und im Unterlaufe bei der Kanalisierung begradigt worden ist.

Nach Stuckenberg's Mittheilung war der Fluß früher nur im Frühling auf wenige Wochen schiffbar, während er jetzt in der eisfreien Jahreszeit vom Anfang April bis Mitte November für den Wasserverkehr zwischen dem Weichsel- und Dnjeprgebiet benutzt wird, der allerdings in trocknen Sommern manchmal Stockungen erleidet. Das Hochwasser überschwemmt nach der Schneeschmelze die ganze Thalsohle und schwillt 1,5 bis 2 m über das sommerliche Mittelwasser an. Nach zwei bis drei Wochen ist die eigentliche Fluthwelle abgelaufen; jedoch halten bordvolle Wasserstände noch bis in den Juni vor. Die über den Muchawjec führenden Straßen- und Eisenbahnbrücken haben für die Abführung des Hochwassers 120 bis 150 m Lichtweite erhalten. Von Eisenbahnen wird er an vier

Stellen überschritten: zweimal (bei Gorodec und Kobrin) von der Zweigbahn Zabinka—Pinsk, zweimal bei Brest von den nach Kowel und nach Cholm führenden Bahnlinien. Unterhalb der letzten Eisenbahnbrücke mündet der Fluß mit drei Armen in den die Festung Brest durchfließenden Bug. Die zum Gouvernement Grodno gehörige Stadt Brest-Litowsk liegt am rechten Ufer des Muchawjec zwischen den beiden von Süden kommenden Bahnlinien, die sich hier mit der west-östlich gerichteten Warschau—Moskauer Bahn vereinigen, während nach Norden die Linie Brest—Prostken(—Königsberg) führt. Die günstige Lage der Stadt an einem wichtigen Knotenpunkte des Eisenbahn- und des Gewässer- netzes hat seit ihrer 1832 erfolgten Neuanlage ein rasches Aufblühen bewirkt, so daß sie an Handel, Gewerthätigkeit und Einwohnerzahl die Gouvernements- hauptstadt übertrifft.

c) Uebrige Zuflüsse des Beckens von Brest-Litowsk.

Etwa 15 km unterhalb der Muchawjermündung ergießt sich links die Krzna in den Bug, deren Bedeutung für das Gewässernetz des Hauptflusses auf S. 134/5 bereits gewürdigt ist. Ihre Quelle liegt im Jatamoores bei Bdzary am hydro- graphischen Knotenpunkte westlich von Lukow. Von dieser Stadt ab fließt ein zweiter Quellbach gleichen Namens mit der Krzna parallel gegen Osten und vereinigt sich mit ihr bei Mjendzyrzec. Unterhalb Biala ergießt sich links die südöstlich gerichtete Klukowka, 10 km weiter flußabwärts rechts die nordnord- östlich gerichtete Bzelawa, die nebst ihrem linksseitigen, bei Rossocz mündenden Nebenbache Mulawa aus dem sandig-sumpfigen Gelände zwischen Parczew und Wlodawa kommt. Der bei Dukodum links mündende Nebenbach Zarnica ent- steht aus den Abzugsgräben des Sumpfgebietes im Norden von Parczew, das eine zweite Entwässerung südwärts nach der Pivonia (Wjeprzgebiet) besitzt. Mit Ausnahme weniger Stellen sind diese Wasserläufe überaus flach in das niedrige Seitengelände eingeschnitten, ihre Thäler oft 1 bis 2 km breit und mit moorigen Wiesen bedeckt. Das mittlere Gefälle der auf 100 km Länge flößbaren Krzna beträgt von der Quelle (+ 166 m) bis zur Mündung (+ 125 m) auf 111 km Länge 0,369 ‰ (1:2710), die Entwicklung in Bezug auf die 84 km lange Luftlinie 32,1 ‰.

Etwa 6 km unterhalb der Krznamündung ergießt sich von rechts die Lesna (Ljesna) in den Bug, nachdem sie von Tjuchenicze ab am Nordrande des Bug- thales entlang geflossen ist. Die sumpfigen Ländereien, welche sich von Tjuche- nicze in Richtung des von Norden kommenden Lesnathales nach Brest-Litowsk ziehen, lassen vermuthen, daß ehemals die Lesna hier ihren Weg nach dem Muchawjec genommen hat. Bei Uchlany oberhalb des Städtchens Kamjenjec- Litowsk entsteht sie aus den beiden Quellbächen Lesna-prawa und Lesna- lewa. (Rechte und Linke Lesna). Letzterer Bach nimmt seinen Ursprung im Czapeliskisumpfe (+ 159 m), der südöstlichen Verlängerung des Dziki-Mikor- Sumpfes, aus dem die Narewka abfließt, unweit Szereszowo. Der südliche Theil des Bialowjezer Urwaldes entwässert in beide Quellbäche. Die flößbare Lesna-prawa durchschneidet ihn auf große Länge, da ihr Ursprung an seiner Westgrenze bei Dubiny liegt, 15 km südlich vom Zusammenflusse des Narew

und der Narewka. Nimmt man diese Quelle (+ 165 m) als Hauptquelle an, so beträgt das mittlere Gefälle der Lesna bis zur Mündung (+ 124 m) auf 122 km Lauflänge 0,336 ‰ (1:2980), die Entwicklung in Bezug auf die 69 km lange Luftlinie 76,8 ‰. Die Entwicklung ist groß, weil das im Allgemeinen südlich gerichtete Thal bis Uchlany Richtung gegen Südosten und von da bis Troscianica gegen Südwesten hat, außerdem aber zahlreiche kleinere Krümmungen besitzt.

Oberhalb Uchlany liegt der Flußlauf mit wenigen Seitenarmen in einem breiten, ganz allmählich in das flache Seitengelände übergehenden Sumpftal, ebenso die Lesna-lewa. Von Uchlany abwärts bildet er dagegen häufig Verzästelungen in dem aus nassen Wiesen bestehenden, selten unter 1 km, oft 2 bis 3 km breiten Thale, das aber im Gegensatz zu den oberen Strecken von scharf markirten, manchmal stark geböschten Thalwänden eingefasst wird, deren Ränder 20 bis 30 m hoch über die Thalsole ansteigen. Die bei Uchlany beginnende Flößerei wird durch zahlreiche Mühlenwehre behindert. Im Sommer ist das bei Kamjenec 10 bis 15, weiter unterhalb bis zu 20 m breite Bett meist nur auf geringe Tiefe gefüllt. Im Frühjahr überschwemmt das Schneeschmelzwasser einen bis zwei Monate lang den ganzen Wiesengrund. Die Eisenbahnbrücke der Linie Brest—Prostken bei Skoki hat zur Ableitung des Hochwassers etwa 180 m Lichtweite erhalten. — Ein bedeutender Nebenbach der Lesna-prawa ist die bei dem gleichnamigen Gehöfte im Bialowjezer Urwalde von rechts mündende Biala, die aus zwei östlich gerichteten Quellbächen entsteht, deren Quellen im Osten des Städtchens Kleszczele liegen.

d) Rechtsseitige Zuflüsse des unteren Bug.

Von dem hier befindlichen hydrographischen Knotenpunkte fließen außerdem die Drlanka nordwärts zum Narew und der bei Stawiszce entspringende Nurzec nach Westnordwest ab. Von Kleszczele bis oberhalb Bransk hat der Oberlauf dieses Flusses ein 3 bis 4 km breites, von 20 m hohen Anhöhen mit flachen Böschungen besäumtes Sumpftal. Der Höhenzug zur Rechten trägt nahe beim Flusse die Wasserscheide des Narewgebiets. Vom linksseitigen Höhenzuge kommen einige nordwärts gerichtete Bäche, namentlich bei Boczi der Nurczyk. Bis zur Mündung der von rechts kommenden Mianka oberhalb Wyszynki ist das Thal weniger breit und nur flach eingeschnitten. (Der wichtigste Quellbach der Mianka, die Tloczewka, durchfließt dieselbe nord-südliche, flach eingeschnittene und sumpfige Thalsohle, welche gegen Norden von der in den Narew mündenden Elina benutzt wird.) Bei Wyszynki biegt der Nurzec gegen Südwesten um und erreicht den Bug über Czechanowjec bei Slepowrony. Dabei fließt er zunächst am Rande des 3 km breiten Osuwkasumpfes entlang, sodann aber durch ein wenig über 1 km breites, um 15 bis 20 m eingeschnittenes Thal, das mit ziemlich hoch liegenden, theilweise sandigen Wiesen bedeckt ist. Zur Flößerei wird der Nurzec angeblich bis nahe zur Quelle auf 96 km Länge benutzt.

Das bei Bransk 15 bis 20 m, unterhalb Czechanowjec etwa 40 m breite Bett des Nurzec hat in den oberen Strecken niedrige torfige, im Unterlaufe 1 bis 2 m hohe sandige Ufer. Zu beiden Seiten der Miankamündung ist der

Flußlauf verästelt, im Uebrigen meist einheitlich geformt, aber reich an Krümmungen. Die Entwicklung des 98 km langen Laufes beträgt in Bezug auf die 67 km lange Luftlinie von der Quelle (+ 176 m) bis zur Mündung (+ 105 m) etwa 46,3 %, das mittlere Gefälle 0,724 ‰ (1 : 1380). Der Nurzec ist also gefällreicher als die übrigen Nebenflüsse des Bug, weshalb seine Hochfluthen ziemlich stürmisch verlaufen und zuweilen die Holzbrücken beschädigen. Außer im Frühjahr sollen auch im Herbst öfters Hochwassererscheinungen eintreten. Die bei Bransk beginnende Flößerei wird durch die Mühlenwehre behindert und hat nur geringe Bedeutung. Von der Mündung aufwärts bis zur Mianka bildet der Nurzec die Grenze zwischen Polen und Litauen, jetzt zwischen den Gouvernements Lomza und Grodno.

Nähe bei den Quellbächen der Mianka entspringt unweit Mazowiec der Brok, im unteren Laufe Broczyſko genannt, der gegen Westsüdwest ein schmales, stellenweise ziemlich tief eingeschnittenes Thälchen durchläuft und oberhalb Brok in den Bug mündet. Die übrigen rechtsseitigen Nebenbäche des unteren Bug haben keine Bedeutung.

e) Linksseitige Zuflüsse des unteren Bug und Narew.

Von den linksseitigen Zuflüssen des unteren Bug verdient nur der Lwjec einer Erwähnung. Von seiner östlich der Gouvernementshauptstadt Siedlce gelegenen Quelle (+ 160 m) bis zur Mündung bei Kamjenczyk (+ 82 m) ist sein nordwestlich gerichteter Lauf 120 km lang. Das mittlere Gefälle beträgt daher 0,650 ‰ (1 : 1540), seine Entwicklung in Bezug auf die 81 km lange Luftlinie rund 48,1 %; diese ziemlich große Entwicklung rührt von zahlreichen kleineren Krümmungen des Thales und des Flußlaufs im Thale her. Seinen Ursprung nimmt er in den Moorniesen bei Prochenki, die sich an Siedlce vorüber bis nach Niviska fortsetzen, wo das bis dahin flach eingeschnittene Thal zur Rechten von 40 m hohen Gehängen eingefasst wird. Kurz zuvor erhält er links die nordwärts gerichtete Muchawka aus dem Sumpflande bei Jastrzembje. In der mittleren Strecke fließt der Lwjec durch ein 1 bis 1,5 km breites, von 15 bis 20 m hohen Thalwänden eingefasstes, öfters versumpftes Wiesenthal bis unterhalb Wengrow. Ähnlich geformt ist das untere Thal des bei Proszew links mündenden Koſtrzyńbachs, der vom hydrographischen Knotenpunkte bei Łukow kommt und im Quellgebiete ausgedehnte Bruchflächen mit moorigen Wiesen und Niederwald durchzieht; seine am meisten östlich gelegene Quelle bei Jastrzembje steht nur wenige Kilometer von den Muchawkaquellen ab. Unterhalb Wengrow beginnt das sandige Nordwestgehänge des Flachlandes von Siedlce, in welchem der Lwjec kein deutlich begrenztes Thal besitzt, obgleich mehrfach die das Gehänge durchziehenden Dünenketten dicht neben dem Flusse Steilränder bis zu 15 m Höhe aufweisen. Das oberhalb 20 bis 40 m breite Bett erweitert sich im Unterlaufe bis zu 100 m, ist aber mit vielen Sänden durchsetzt, die nur bei Hochwasser überschwemmt werden und den auf 44 km Lauflänge stattfindenden Floßverkehr zuweilen behindern. Die unweit Jadów links mündende Osownica liegt mit dem größten Theile ihres Laufes in diesem Landstriche.

Die Osownica und ihre Nebenbäche gehören zu den Wasserläufen, welche von der im Norden des Städtchens Kaluszyn liegenden, bis zu + 220 m hohen Bodenschwelle fächerförmig gegen Norden bis Westnordwesten abfließen. Im Oberlaufe haben sie starkes Gefälle und schmale, ziemlich tief eingesenkte Thälchen, im Unterlaufe geringes Gefälle und keine markirten Thalwände. Bloß dort, wo sie die hier besonders reich entwickelten Dünenzüge durchschneiden oder zwischen solchen entlang fließen, erheben sich oft beträchtliche Anhöhen nahe bei den Ufern. Am wichtigsten sind unter diesen Wasserläufen die in den unteren Narew mündenden Bäche Rzoncza (oberhalb Zegrze) und Czarna (gegenüber Zegrze). Die Rzoncza durchbricht den Dünen Gürtel, der sich hier bogenförmig um das Städtchen Radzymin zieht, von Los ab, die Czarna bei Pułtelnik, ihr Nebenbach Zonza (Czarna-Struga) bei Marki. Letztere beiden Wasserläufe verliefen sich früher in der 3 bis 4 km breiten, nordwärts gerichteten Moorniederung, welche von Praga (an der Weichsel) nach dem Narewthale gegenüber Zegrze zieht und durch mehrere Abzugskanäle entwässert worden ist. Bei Juzesow zweigt von dieser Niederung spitzwinklig ein Seitenarm ab, den der unweit Praga beginnende Brudnowskikanal durchzieht; seine Mündung erfolgt in den Narew gegenüber Dembo. Die Mündungsstrecke der Czarna heißt Krulewskikanal. In ihn mündet der Nowy-Kanal, dem das Wasser der Zonza durch den Markowskikanal zugeführt wird. Längs der Niederung des Brudnowskikanals bildet die linksseitige, mit dem Weichselstrom parallel verlaufende Dünenkette auf lange Strecke einen Steilrand von 20 bis 30 m Höhe.

3. Bodenbeschaffenheit.

Im südlichen Theile des russischen Buggebietes gehört die geologische Unterlage vollständig, vielfach aber auch die Oberfläche der Kreideformation an. Vom Wjeprz bei Krasnyjstaw aus verbreitet sich (Pusch, „Geognost. Bschrbg. v. Polen“, II S. 332) ein Zug schreibender Kreide, die aber nur inselartig hier und da aus dem Alluvium hervorragt, weit gegen Norden. Hierher sind zu rechnen die auf der geologischen Karte nur zum Theil angegebenen Vorkommnisse bei Cholm, Siedliszcze, Konstantinowka und Lufuwel zwischen Wjeprz und Bug, ferner bei Wlodawa, Roden, Terespol, Mielnik und Drohiczyn am Bug, sowie bei Bransk am Nurzec, außerdem im oberen Narewgebiete von Suraz am Narew bis Lipsk an der Biebrza. Von Krasnyjstaw aus gegen Südosten erfüllt die Kreide das ganze Gebiet des Wjeprz und das der Huczwa bis zum Bug; von Tomaszow überschreitet es dann die galizische Grenze. Ebenso breitet sie sich östlich vom Bug im südlichen Wolynien aus.

Der auf großen Flächen die Unterlage des fetten Weizenbodens bildende Kreidemergel, den man in Polen allgemein opoka nennt, zeigt drei Spielarten, je nachdem Kalk oder Thon oder Sand in ihm vorherrschen. (Pusch a. a. O. Bd. II S. 339.) Die kalkige Spielart kommt am häufigsten vor und verläuft sich einerseits in wirkliche Kreide, andererseits in dichte, flachmuschelige, dem Jurakalk ähnliche Kalksteine. Durch die Einwirkung von Luft, Wasser und Frost zerfällt dieser Kreidemergel schnell in dünne, scheibenförmige Bruchstücke. Die